

( 醫病溝通快速上手 )

## mCRPC 病友提問清單

看診時總是不好意思開口問？  
別擔心，提問清單幫助您，主動提出問題  
讓醫師充分提供您需要的資訊！

## 診斷後

- ◆ 我的檢查結果代表什麼意思？
- ◆ 我還需要做什麼額外的檢查？
- ◆ 我有哪些治療選擇？該怎麼選擇？
- ◆ 我的治療目標是什麼？

## 治療中

- ◆ 這些治療對我有什麼幫助？
- ◆ 治療的副作用有哪些？出現副作用時，我該怎麼做？
- ◆ 我原本在服用的藥物或保健品，會影響我的治療嗎？

## 治療後

- ◆ 我要如何知道治療有沒有效？
- ◆ 我多久須要回診做檢查？要做哪些追蹤檢查？
- ◆ 有疑問的時候，我可以聯絡誰？

寫下其他想問的問題...



我知道這個診斷聽起來有點可怕，但別忘了，我們可以選擇積極面對，尋找適合自己的治療方式。

主動跟醫師說明身體狀況的變化：疲倦、無力、骨痛等為攝護腺癌造成之常見症狀，勿輕易以老化為由而忽視。不是疾病控制我，而是我控制它！



保持樂觀！新的治療、新的研究不斷進展，與醫師保持聯繫了解最新的進展。同時記得，健康的生活方式也能大大提高生活品質。

References: 1.O'Sullivan JM, et al. Future Oncol. 2023;19(15):1021-1028.  
2.衛生福利部台灣病人安全資訊網。醫病共享決策簡介。  
Available at: <https://www.patientsafety.mohw.gov.tw/xmdoc/cont?xsmsid=0M097527397785648684> (Accessed in 2024.03)

臺灣楓城泌尿學會



攝護腺癌知識館



文獻原文淺白用語



您寶貴的意見回饋



HOPE  
癌症希望基金會  
HOPE FOUNDATION FOR CANCER CARE



# 轉移性 去勢抗性 攝護腺癌

( 知識導讀  
報你知 )

您的姓名：\_\_\_\_\_

就診醫院：\_\_\_\_\_

當已接受、或正在接受荷爾蒙治療的男性，

- ◆ 攝護腺特異抗原 (PSA) 升高，並不再對荷爾蒙治療產生反應
- ◆ 檢查發現癌症已轉移到其他器官



就稱為 **轉移性去勢抗性攝護腺癌 (mCRPC)**

## 轉移性去勢抗性攝護腺癌的治疗有哪些？

治療目的在於「延長存活期」，並改善或維持病人的生活品質。

### 新型口服荷爾蒙藥物

能降低體內雄性素的濃度，減緩癌細胞的生長

核准藥物：Abiraterone、Enzalutamide  
治療方式：每日口服

#### 適用情況

通常會同時接受注射劑型的全身性荷爾蒙治療。



### 化學治療

能殺死快速生長的細胞，且不只針對攝護腺腫瘤，也能殺死骨骼和其他器官中的癌細胞

核准藥物：Docetaxel、Cabazitaxel  
治療方式：靜脈輸注

#### 適用情況

癌細胞會快速分裂增殖，為化療的良好標靶；然而，這也代表快速生長的正常細胞（例如頭髮和指甲）也會受化療影響，導致副作用。



### 標靶治療

以發生基因突變的細胞為目標發揮抗癌作用，病人需要先進行腫瘤細胞的基因檢測

核准藥物：Olaparib  
治療方式：每日口服



#### 適用情況

此類藥物幾乎只用於「具有同源重組修復基因（例如：BRCA1,2）異常」的病人。

### 鐳-177 PSMA

使用在攝護腺癌細胞中，一種稱為 PSMA 的蛋白來遞送放射線分子鐳-177，藉此殺死癌細胞

治療方式：靜脈輸注

#### 適用情況


先前接受第二代荷爾蒙藥物和特定化療治療的男性。



## 除了上述全身性治療外，當攝護腺癌「轉移到骨骼」時，有什麼治療選擇？

### 鐳-223

放射性分子，能移動到骨轉移的病灶區域，釋放放射線來殺死該區域的癌細胞



治療方式：靜脈輸注（每個月一次，最多6次）

☺ 鐳-223 可到達骨骼中所有癌症病灶

🧐 由於輻射只會移動短距離，因此鐳-223 對於健康組織的影響很小，故副作用有限（包括噁心、嘔吐、腹瀉及骨髓抑制等）

#### 適用情況

建議僅發生骨轉移的病人使用。醫師支持及早開始使用，因為資料顯示患者完成治療（6劑鐳-223）時所獲得的效益最多。

## 您聽說過 mCRPC 病人有較高的「骨質疏鬆症」風險嗎？

骨質疏鬆症在此一族群中相當常見，因此了解風險和攝護腺癌治療中可採取的必要措施非常重要。

### 您是否有以下導致骨骼不健康的因素？

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 雄性素剝奪療法  | <input type="checkbox"/> 老化     |
| <input type="checkbox"/> 類固醇治療    | <input type="checkbox"/> 鈣質攝取量低 |
| <input type="checkbox"/> 放射線治療    | <input type="checkbox"/> 身體活動量低 |
| <input type="checkbox"/> 體格瘦小     | <input type="checkbox"/> 吸菸     |
| <input type="checkbox"/> 骨質疏鬆症家族史 | <input type="checkbox"/> 酒精     |

### 為了促進骨骼健康，您可以嘗試：

- ◆ 攝取富含鈣質和維生素 D 的均衡飲食，如深綠色葉菜
- ◆ 與醫師討論是否需要使用抗骨質疏鬆藥物
- ◆ 戒菸、減少酒精攝取
- ◆ 規律且充足的睡眠
- ◆ 規律的運動



接受任何 mCRPC 治療的病人應考慮使用 DEXA 掃描來測量骨骼健康，請向醫師詢問相關資訊

